

藥物成分

劑型

櫃號

Ketosteril

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-253

## ☞ 藥品商品名及含量

吉多利錠 36 毫克/錠 (Ketosteril)

## ☞ 藥品作用

五種必需胺基酸和五種必需胺基酸的 $\alpha$ -酮酸。 $\alpha$ -酮酸在體內可以轉化成必需胺基酸，減少體內尿毒含量，幫助改善尿毒症的症狀並減輕腎臟的負擔。

## ☞ 服用方式

1. 成人每次 4-8 粒，一天三次隨餐服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是高血鈣症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是含鈣藥品、氫氧化鋁、易和鈣形成複合物的藥物(如：tetracycline)。
3. 常見副作用為高血鈣症，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診，並定期檢查血清鈣含量。
4. 請配合醫師指示，限制每日蛋白質攝取量，飲食也應攝取足夠的卡路里，以達到效果。
5. 目前對孕婦或胎兒的影響不明，女性若計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。