



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Terazosin</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-770		

## ☞ 藥品商品名及含量

脈降錠 2 毫克/錠 (Telowsin)

定脈平錠 2 毫克/錠 (Hytrin)

## ☞ 藥品作用

具血管擴張、放鬆膀胱頸和攝護腺肌肉的作用，用以治療高血壓、良性攝護腺肥大症。

## ☞ 服用方式

1. 用於高血壓，通常每日 1 次，每次 0.5~2.5 粒。
2. 良性攝護腺肥大症，通常睡前 1 次，每次 0.5~5 粒。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是治療勃起功能障礙的藥物，如：tadalafil、sildenafil，以及  $\beta$ -blocker 類藥物，如：atenolol、bisoprolol、carvedilol。
3. 服用本藥初期，可能會有暈眩的情況，應避免開車或操作危險機械。
4. 本藥服用過量可能會導致血壓過低及昏厥，應漸進式增加劑量。
5. 常見副作用為暈眩、頭痛、頭重腳輕等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：昏厥、心跳加快/不規律。
7. 目前孕婦之安全性尚未確立，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。