

藥物成分

劑型

櫃號

Biperiden

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-060

☞ 藥品商品名及含量

安汀復錠 2 毫克/錠 (Akinfree)

百比停錠 2 毫克/錠 (Bipiden)

☞ 藥品作用

1. Biperiden 可用於帕金森氏疾病，可治療肌肉僵硬和動作無力感及減少唾液分泌。
2. 此藥也可能用於治療其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

☞ 服用方式

1. 常用劑量為每日 3~4 次，每次一粒。
2. 請按照醫生指示服藥，不可自行填整劑量或增加服藥次數，若不慎忘記服藥，請立即補服。若已接近下次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是 biperiden 或其他藥物有過敏的反應、狹角性青光眼，腸障礙、巨腸結者均不可使用。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗精神藥及三環抗抑鬱藥物、一般抗心律不整藥物 (如:quinidine 鹽類和抗組織胺)、一般止痛劑、帕金森氏症藥物。(如:meperidino,phenothiazines)。
3. 酒精會加重此藥導致的暈眩作用，服用此藥期間請勿飲酒。
4. 常見副作用為：皮膚乾、視力模糊，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀 請立刻就醫：嚴重口乾、排尿困難、暈眩、畏光、肌肉虛弱。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。