

藥物成分

劑型

櫃號

Letrozole

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-647

☞ 藥品商品名及含量

利妥柔膜衣錠 2.5 毫克/錠 (Lovizol F.C.)

復乳納膜衣錠 2.5 毫克/錠 (Femara F.C.)

☞ 藥品作用

Letrozole 是一種抗腫瘤藥，可減緩或停止體內癌細胞生長，用於停經後之末期乳癌或轉移性乳癌之治療。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對 letrozole 過敏、肝臟疾病、曾有血栓病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 tamoxifen 或其他口服抗乳癌藥品。
3. 本藥可能會讓人疲勞和頭昏暈，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 若醫師指示須長期治療，建議可定期監測骨密度及預防骨質疏鬆。
5. 常見副作用為熱潮紅、關節痛、噁心及疲勞，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受或病況改變請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：瘙癢或蕁麻疹，臉部或手部腫脹、下肢水腫脹痛，嘴巴或喉嚨腫脹或刺痛，胸悶/痛，呼吸困難。
7. 目前對胎兒的風險已確立，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。