



藥物成分

劑型

櫃號

Leflunomide

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-266

## ☞ 藥品商品名及含量

美時雅努麻錠 20 毫克 (Arheuma Tablets)

希關炎膜衣錠 20 毫克 (Pharnomide Film-Coated Tablets)

## ☞ 藥品作用

治療成人類風濕性關節炎

## ☞ 服用方式

1. 通常由一日一次，一次 5 粒，並持續 3 日作為起始治療，之後以一日一次，一次 0.5~1 粒做持續治療。
2. 可與食物併服或不併服。需要整顆吞服，並請喝足夠量的冷開水。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝功能不全及重度免疫系統功能缺乏之病患。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是具有肝毒性或血液毒性的藥物或是會影響其他藥物代謝的藥物，如 phenytoin、warfarin 及 tolbutamid。
3. 服藥前及服藥後前 6 個月，請定期監控肝功能及完整的血液細胞數檢查。
4. 常見副作用為腹瀉、噁心嘔吐、食慾不振、口腔黏膜疾病(如口瘡性口腔炎、口腔潰爛)、腹痛、肝功能指數上升、頭痛、暈眩、肌腱及腱鞘發炎，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：黃疸(皮膚變黃或黃褐色、眼白的部位呈現黃色)、急性過敏反應(呼吸困難、蕁麻疹、

呼吸急促、意識混亂)、嚴重皮膚不良反應(口腔/黏膜潰爛、表皮脫落、眼睛癢、水泡)、感染(發燒、寒顫、咳嗽、喉嚨痛、呼吸困難)。

6. 男性病患應注意可能有男性引起的胎兒毒性，服藥期間應使用有效的避孕方法。
7. 研究顯示本藥品具有致畸胎性，懷孕期間應避免使用此藥品。
8. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。