

藥物成分

劑型

櫃號

Calcium
Folate

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-092

☞ 藥品商品名及含量

補血寧錠 15 毫克/錠 (Bloodlet Tablet)

芙琳亞錠 15 毫克/錠 (Folina Tablet)

☞ 藥品作用

超量使用葉酸拮抗劑時、消滅其毒性及抵消其作用、治療因斯潑盧營養缺乏、妊娠及幼齡等引起之巨初紅血球性貧血。

☞ 服用方式

1. 以 methotrexate 作抗癌治療後，應於醫師監控下，投與本藥作為預防性用藥。

使用 methotrexate 治療時，預防因 tetrahydrofolic acid 缺乏而產生的毒性(投與補血寧錠救助)。療程中，methotrexate 劑量大約於 100 毫克/平方公尺體表面積時即應投與本藥。以高劑量 methotrexate 治療而發生休克時，投與本藥救助並未有一定的建議劑量，以下建議劑量僅供參考：

投與 methotrexate 治療後，以 Calcium Folate 救助：

MTX 血中濃度 24-30 小時	Calcium Folate 劑量	使用時間
$< 1.5 \times 10^{-6} \text{ mol/l}$ - $1 \times 10^{-6} \text{ mol/l}$	每 6 小時 10-15 毫克/ 每平方公尺體表面積	48 小時
$< 1.5 \times 10^{-6} \text{ mol/l}$ - $5 \times 10^{-6} \text{ mol/l}$	每 6 小時 30 毫克/ 每平方公尺體表面積	直到血漿濃度小於 $5 \times 10^{-8} \text{ mol/l}$
$> 1.5 \times 10^{-6} \text{ mol/l}$	每 6 小時 60-100 毫克/ 每平方公尺體表面積	直到血漿濃度小於 $5 \times 10^{-8} \text{ mol/l}$

Calcium Folate 係以口服投與，因此，當病人無法吸收

時(例如：嘔吐)，則不應以 Calcium Folate 救助，以口服 Calcium Folate 吸收之作用機轉即是達到飽和作用。在口服大於 40 毫克 Calcium Folate 之單一劑量時，則其藥品生體可用率會降低。

2. 治療缺乏 Folic acid 之情形：

- 成人每天：10~20mg，以每日口服一錠 Folina(1 tablet/day)最常使用。
- 小於 12 歲之孩童：
每天每公斤給予 0.25mg(0.25mg/kg/day)

∞ 注意事項

1. 當以 methotrexate 治療且投與 Calcium Folate 以供預防時，應該考慮監測 methotrexate 之血中濃度。
2. 可能產生過敏反應，在高劑量下，可能發生胃腸不適、日夜顛倒、興奮或沮喪等情形。
3. 在獨立病例中，曾有癲癇病人痙攣頻率增加之報告。
4. 在懷孕(C級)及授乳期，應注意事項：對缺乏葉酸或如適應症述及情形下的孕婦及授乳婦，並未禁用本品。然禁用 methotrexate 之孕婦及授乳婦，於治療時則無須此類之預防性治療。
5. 本藥品 25°C以下儲存。