



藥物成分	劑型	櫃號
Tamsulosin	口服藥	
版本：TPE202309／流水號：2023-410		

☞ 藥品商品名及含量

活路利淨持續性藥效膜衣錠 0.4 毫克(Harnalidge OCAS)

愛順暢持續釋放膠囊 0.4 毫克 (Alfatam)

暢利淨 D 持續釋放口溶錠 0.2 毫克 (Tamsulosin D)

若通持續釋放口溶錠 0.2 毫克 (Zotan ODT)

☞ 藥品作用

Tamsulosin 可用來治療良性前列腺肥大的症狀。也可能用於治療其他病症，請詢問您的醫師或藥師。

☞ 服用方式

1. 成人：通常一天服用一次。建議在每天固定一餐的餐後 30 分鐘服用。
2. 若劑型標示為持續性藥效膜衣錠或持續釋放膠囊應直接吞服，不要咬碎、咀嚼或打開服用。若劑型標示為口溶錠，則可直接放置於口中，僅需少許唾液即可在口腔內崩散或溶解，亦可使用開水協助溶化吞服。

☞ 注意事項

1. 若對 tamsulosin 有過敏反應，請告訴醫師，並禁止服用。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物（包含非處方藥），特別是抗凝血劑，如：warfarin，或其他用於治療前列腺肥大與降血壓的藥物如 doxazosin、prazosin、terazosin。
3. 如果您將要進行手術（包含牙科手術），要記得告訴醫師或牙醫師您正在使用 tamsulosin。
4. 這個藥可能會導致嗜睡，在您清楚藥物可能對您的影響前不要開車或使用危險機械。
5. 酒精會增加該藥的嗜睡作用，服藥期間請勿飲酒。
6. 常見副作用為腸胃不適、眩暈、嗜睡、流鼻水、胸痛、性功能失調，一般不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。