

藥物成分

劑型

櫃號

Gefitinib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-609

## ☞ 藥品商品名及含量

艾瑞莎膜衣錠 250 毫克/錠 (Iressa F.C.)

費艾舒膜衣錠 250 毫克/錠 (Veiasu F.C.)

## ☞ 藥品作用

作用於表皮生長因子受器(EGFR)的抗癌標靶藥物，可抑制癌細胞的生長，主要用於治療非小細胞肺癌或肺腺癌。

## ☞ 服用方式

1. 通常口服每天 1 次，可空腹或與食物併用。
2. 無法整粒吞服錠劑時，可將錠劑(不要壓碎)於半杯水中崩散後(約 15 鐘)，立即服用，再以半杯水沖洗杯緣並喝下。此溶液也可用鼻胃管餵食。
3. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增減次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若距離下一次服藥不到 12 小時，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 CYP3A4 誘導劑(phenytoin、cabamazepine、rifampicin、巴比妥類、聖約翰草)、CYP3A4 抑制劑(itraconazole)、抗凝血劑 warfarin、制酸劑、vinorelbine。
3. 本藥可能會讓人較為衰弱，開車或操作危險機械需特別注意。
4. 常見副作用為腹瀉、皮膚發疹、發癢、乾燥及面皰等。如果有下列症狀，請立刻就醫：發生呼吸困難、咳嗽及發燒，嚴重持續腹瀉/噁心/嘔吐或厭食、急性角膜炎或惡化眼睛疾病(眼部發炎、流淚、光敏感、視覺模糊、眼睛痛和/或紅眼)。

臺北市立

5. 資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

6. 本藥會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。