

藥物成分

劑型

櫃號

Propiverine

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-364

☞ 藥品商品名及含量

優合膜衣錠 15毫克/錠 (Urotrol F.C. Tablets)

☞ 藥品作用

用於膀胱不穩定或脊髓損傷導致膀胱迫尿肌反應過度的尿失禁、尿急及頻尿。

☞ 服用方式

1. 一般每次一粒，每天 2-3 次。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝功能異常、腸阻塞、膀胱阻塞、重肌無力症、巨結腸症、青光眼、心律不整等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是三環抗憂鬱劑、鎮靜劑、抗膽鹼藥物、抗精神病藥物。
3. 常見副作用為口乾、視覺模糊、腸胃不適、血壓降低，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀 請立刻就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有不良反應，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師 / 藥師。