

藥物成分	劑型	櫃號
Enoxolone/ Benzocaine/ Lidocaine/ Phenylephrine/ Bismuth Subnitrate/ Chlorhexidine Acetate	肛門 栓劑	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-470		

☞ 藥品商品名及含量

肛門栓劑：千痔康栓劑





Enoxolone (Glycyrrhetic Acid) 20mg, Benzocaine 50mg, Lidocaine 20mg, Phenylephrine 2.4mg, Bismuth Subnitrate 100mg, Chlorhexidine Acetate 5mg (Anti-gi suppository)

☞ 藥品作用

使用於內痔、外痔、痔出血、肛門周圍炎、肛門裂傷。

1. Enoxolone：強力消炎劑
2. Lidocaine、Benzocaine：具有表面之麻醉作用，廣泛的應用於粘膜及皮膚的局部病變，可阻斷區域性神經，產生知覺麻痺。
3. Phenylephrine HCl：其可使粘膜血管收縮而減少水腫和充血現象，且可使平滑肌鬆弛，減輕由於痙攣引起之窘迫感。
4. Bismuth Subnitrate：具有粘膜消炎收斂的作用，於損傷之粘膜或皮膚，形成一層不溶性保護膜，以防止刺激，並可抑制粘液和其他腺體之分泌。
5. Chlorhexidine Acetate：為一種迅速殺菌、消毒的皮膚粘膜清潔劑。

使用方式

<p>1. 使用肛門栓劑前後需用肥皂及清水將雙手洗淨。</p>	
<p>2. 打開或撕開栓劑的外包裝</p>	
<p>3. 側躺於床，一腳屈膝向前，用手將臀部抬起，露出肛門位置</p>	
<p>4. 將栓劑由尖端沿著肛門口緩緩推入推入深度成人約 1~2 指節(2.5 公分~4 公分)嬰幼兒可推入半指節到 1 指節深度(1.5 公分~2.5 公分)</p>	
<p>5. 塞完後臀肌用力夾住肛門至少 1 分鐘，避免栓劑被反射性排出(幼兒可用手幫忙輕夾臀部輔助)，之後保持躺姿 15 分鐘。</p>	

注意事項

1. 使用前請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或準備懷孕、正在懷孕/哺乳、直腸結構問題或其他腸胃道疾病。
2. 平時應存放於陰涼防潮處(除非有藥袋有特殊指示)，若因

炎熱變軟無法使用，可將原包裝的栓劑放在冷藏或冰水內30分鐘後，再去除包裝使用。

3. 塞入前可用水性潤滑劑或冷水稍微潤濕栓劑前端再塞入。(不可使用凡士林作為潤滑劑，避免影響藥效)
4. 本藥勿大量或大體表面積使用，儘可能以可達預期療效之最少劑量使用。
5. 常見副作用為嗜眠及倦怠，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 使用後可能會有輕微搔癢或黏濁液體流出，是正常的不需太過於擔心，但若肛門附近出現持續的刺激感/疼痛、腹痛或過敏反應(皮膚紅疹、搔癢、全身不適)時，應停藥並儘速聯繫醫療人員。
7. 如果有下列症狀，請立刻停用就醫：持續出血情形、休克(過敏)反應。
8. 本藥品含 Benzocaine 可能造成罕見但嚴重的變性血紅素血症(虛弱、精神混亂、頭痛、呼吸困難，或皮膚顏色呈現蒼白灰色或藍色;用藥後通常 2-3 小時內發生)。
9. 可能導致發生間歇性痙攣、昏迷、精神錯亂、運動神經障害等精神神經系統副作用(初期症狀為不舒服感、記憶力減退、頭痛、四肢無力、注意力減低等)之報告，請立刻停用就醫。而於使用此類製劑時應注意(a)嚴守用法用量(b)不得連續使用一週以上。
10. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。