



藥物成分	劑型	櫃號
Empagliflozin/ Metformin	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-182		

☞ 藥品商品名及含量

恩美糖膜衣錠 12.5 毫克及 850 毫克/錠 (Jardiance Duo)

☞ 藥品作用

適用於單用 metformin 或 empagliflozin 時血糖控制不佳，或早已同時接受 metformin 和 empagliflozin 合併治療而狀況穩定者的第二型糖尿病成人病人，在飲食與運動外，做為改善血糖之輔助治療。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2 次，隨餐服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是中至重度腎功能不全、末期腎病、透析病人、急慢性酸中毒包括糖尿病酮酸中毒。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是利尿劑、糖尿病促敏劑、胰島素。
3. **請勿飲酒過量**，酒類會加劇 metformin 對乳酸代謝的效果。
4. 常見副作用為腸胃不適、低血糖、泌尿道感染、暈眩、嘔吐、排尿增加、低血壓，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：乳酸酸中毒、酮酸中毒(不明原因過度換氣、肌肉痛、嗜睡、心跳緩慢、寒冷)；嚴重泌尿道感染(生殖器部位紅腫熱痛、發燒)；過敏反應(血

管水腫、蕁麻疹)；急性腎臟損傷(急性疾病、嘔吐、嘔吐、過度熱暴露)。

6. 由於動物資料顯示有不良腎臟影響，因此**不建議在懷孕第二孕期和第三孕期使用**，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，可能對接受哺乳的嬰兒造成嚴重的不良反應，**服藥期間不建議哺乳**。