



藥物成分

劑型

櫃號

Itraconazole

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-250

☞ 藥品商品名及含量

適撲諾膠囊 100 毫克/膠囊 (Sporanox)

易克黴膠囊 100 毫克/膠囊 (Icomein)

☞ 藥品作用

此藥為一種酵素，會抑制黴菌細胞膜的合成，進而使黴菌死亡，用於治療全身性或深部黴菌感染、甲癬、髮癬。

☞ 服用方式

1. 依不同的黴菌感染有不同的使用劑量與頻次，通常一天 1~2 次，每次 1~2 粒，飯後立即服用，膠囊應整粒吞服。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否對 itraconazole、azole 類抗黴菌藥物或其他藥物過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有其他疾病，特別是肝臟疾病、腎臟疾病及心臟疾病。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是鈣離子阻斷劑(felodipine、lercanidipine、nisoldipine)、ticagrelor、dronedarone、eplerenone、ivabradine、ranolazine、tolvaptan、silodosin、methadone、mizolastine、pimozide、quinidine、降血脂藥(lovastatin、simvastatin)、鎮靜安眠藥(triazolam、midazolam)、domperidone、ergot 生物鹼類、irinotecan、lurasidone、lomitapide、avanafil、dapoxetine、darifenacin、vardenafil、solifenacin、colchicine、eliglustat。
4. 胃內酸度降低會減少此藥吸收。若需服用胃酸中和劑(如：氫氧化鋁)或胃酸分泌抑制劑(如：H₂ 受體阻斷劑、質子幫

浦抑制劑)，應於服用此藥前至少 1 小時或服用此藥後至少 2 個小時才可使用。

5. 常見副作用為頭痛、噁心及腹痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮膚發疹、發癢)；肝功能異常(食慾降低、噁心、嘔吐、疲倦、腹部疼痛、茶色尿、皮膚或眼白變黃、糞便變白)；聽力受損(耳鳴、聽力喪失)、神經病變(味覺障礙、感覺遲鈍、皮膚感覺異常)；心跳異常(心律不整、呼吸困難、水腫)。
7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 育齡婦女使用此藥治療時應避孕，並持續有效避免措施至治療結束後之經期。
9. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。