



藥物成分

劑型

櫃號

Naproxen

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-307

☞ 藥品商品名及含量

拿痛長效持續性藥效錠 750 毫克 (Naton S.R.)

☞ 藥品作用

消炎、鎮痛、解熱

☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次 1 粒。
2. 需要整粒吞服，不要咀嚼、分開或壓碎錠劑。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是消化性潰瘍、腎、肝功能不良病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是精神疾病相關藥物、免疫抑制劑 cyclosporin、抗凝血藥 warfarin、磺胺類藥物 sulfonamides、類固醇。
3. 使用本藥期間，若配合的類固醇治療考慮降低劑量或停用時，應慢慢地降低劑量，且仔細觀察是否出現相關副作用，像是腎上腺不全及風濕性關節炎症狀加重等。
4. 本藥可能會讓人眩暈/嗜睡，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
5. 如有要進行凝血試驗或腎上腺功能試驗，請事先告訴醫師或檢查醫事人員或藥師您正在服用此藥。
6. 常見副作用為腸胃道不適、噁心、眩暈、頭痛、嗜睡、瘀斑、搔癢、皮疹、水腫，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：腸胃道出血/潰瘍/穿孔、紅疹/皮疹/搔癢、心肌梗塞、中風。

臺北市立

8. 有研究資料顯示，懷孕期間使用本藥會有致畸胎的風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。