



藥物成分

劑型

櫃號

Carbomer

眼用藥

版本：TPE202309／檔號：2023-097

## ☞ 藥品商品名及含量

睛潤眼用凝膠 0.2% 10gm (Ginsol Gel)

睛瑩眼用凝膠 0.2% 10gm (Ginpol Gel)

## ☞ 藥品作用

治療乾眼症。

## ☞ 使用方式

1. 依照病情輕重，白天及睡前約使用 3~5 次，若有需要可增加使用次數，每次一滴點於結膜囊內，使用時隱形眼鏡需取下，點後隔 30 分鐘再戴上。
2. 本藥點藥時，管子請拿直，擠壓時，形成小滴，順管口落下。
3. 請依醫師指示滴藥，不可自行調整劑量或增加滴藥次數。若不慎忘記滴藥，請立即補滴，但若已接近下一次滴藥，在下次用藥時間滴藥即可，不可為了補劑量而滴用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是對賦形劑 cetrimide 過敏。
2. 假如與其他點眼液併用，請至少隔開 5 分鐘，且本藥應最後使用。
3. 本藥點後會有大約 5 分鐘的視力模糊現象，故駕車和操作機器者宜注意。
4. 本藥通常不會造成任何副作用，極少病人偶有眼睛暫時的刺激感和發癢，但一般都不嚴重，若症狀嚴重或持續時請回診。
5. 目前對胎兒的風險不明，但臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。