



藥物成分	劑型	櫃號
Cabotegravir sodium	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-083		

☞ 藥品商品名及含量

莫帕滋膜衣錠 30 毫克/錠 (Vocabria)

☞ 藥品作用

與rilpivirine 錠劑併用，短期治療已達病毒學抑制效果，且對cabotegravir 及rilpivirine 不具抗藥性之成人的人類免疫不全病毒(HIV-1)感染症。

☞ 服用方式

1. 口服導入療程：應每天一次服用一粒 Vocabria 30 毫克錠劑和一粒 rilpivirine 25 毫克錠劑。
2. 與 rilpivirine 併用時，cabotegravir 錠劑應隨餐服用。
3. 如果病人漏服一劑藥品，且預定服用下一劑的時間不在 12 小時之內，病人應儘快服用漏服的劑量。如果預定服用下一劑的時間已在 12 小時之內，則不可服用漏服的劑量，只要恢復平常的服藥時間即可。
4. 如果病人在服用本錠劑後 4 小時內發生嘔吐，應另外服用一粒錠劑。如果病人在服用本錠劑超過 4 小時後發生嘔吐，則直到下一個平常排定的服藥時間之前都不須另外服用此藥品。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是半乳糖不耐症、全乳糖酶缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良等罕見遺傳問題之病人。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是制酸劑(如鎂、鋁或鈣)、抗痙攣劑(carbamazepine、oxcarbazepine、phenytoin、phenobarbital)、抗分枝桿菌藥物(rifampicin、rifapentine)。
3. 請按醫囑確實完成療程頻率及天數，避免產生抗藥性。

4. 常見副作用為頭痛、發燒、頭暈、疲倦無力、腸胃不適等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(全身性皮疹、蕁麻疹)、精神疾患(憂鬱、焦慮、睡眠障礙)、肝功能指數異常等。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有生殖毒性的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。