

藥物成分

劑型

櫃號

Pazopanib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-334

## ☞ 藥品商品名及含量

福退癌膜衣錠 200 毫克/錠 (Votrient Film Coated Tablets)

## ☞ 藥品作用

用來治療晚期腎細胞癌或晚期軟組織肉瘤。

## ☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次 4 粒，於空腹時服用。
2. 整粒吞服，不要壓碎錠劑。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，如果與下次服藥時間的間隔小於 12 個小時，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝功能疾病。
2. 服用此藥可能阻礙傷口癒合，如有要手術，請事先告訴醫師您正在服用此藥。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
4. 服藥期間，請定期監控肝功能指數。
5. 常見副作用為高血壓、頭髮及皮膚色素脫失、腹瀉、噁心、嘔吐、呼吸困難，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：眼白與皮膚泛黃(黃疸)、不尋常的深色尿液、異常疲倦、右上腹部疼、異常出血、動脈血栓事件、胃腸道穿孔及瘻管。
7. 懷孕期間使用本藥會造成胎兒的傷害，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。育齡婦女於服藥期間或停止治療後兩週內，應進行有效的避孕措施。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。