



藥物成分	劑型	櫃號
Bupropion Hydrochloride	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-078		

☞ 藥品商品名及含量

威克倦持續性藥效錠 150 毫克/錠(Wellbutrin XL)

☞ 藥品作用

本藥適用於治療憂鬱症

☞ 服用方式

1. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。此藥需規律服用數個星期後才能完全發揮藥效。
2. 空腹或隨餐服用均可，但應整粒吞服，不可切、壓碎或嚼碎。
3. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 本藥禁用於對於 bupropion 或製劑中其他任何一種成分過敏者、癲癇患者及突然停止使用酒精或鎮靜劑的病人。
2. 服藥期間請勿飲酒，請告訴醫師或藥師您正在服用的其他藥物或過去 2 星期所服用的藥物，特別是抗凝血劑 warfarin (Coumadin)、抗組織胺、carbamazepine (Tegretol)、cimetidine (Tagament)、levodopa (Sinemet、Larodopa)、lithium (Eskalith、Lithobid)、MAO inhibitors [phenelzine (Nardil)、tranylcypromine(Parnate)]、高血壓藥、痙攣發作藥、感冒藥、氣喘藥或過敏藥 methylphenidate (Ritalin)、ritonavir (Norvir)、鎮靜劑、助眠劑、甲狀腺藥、安神劑及 vitamins。
3. 常見的副作用為失眠，通常是暫時性的。避免於就寢時間服藥或是在臨床上必要時減低劑量，可減少失眠。
4. 其他可能副作用：頭痛、噁心、嘔吐、厭食、體重減輕、

心搏過速、皮疹、搔癢等，一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

5. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。

其他注意事項

1. 此藥停藥須慢慢減低劑量，請遵照醫囑使用，不可未與醫師商量自行停藥。
2. 若有自殺意念或不尋常的行為改變，請隨時與醫師聯絡。
3. 本藥之錠劑外膜可能會與你的糞便一同排出，為正常現象不需擔心。