



藥物成分

劑型

櫃號

Rifampin

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-729

☞ 藥品商品名及含量

立汎黴素膠囊 300 毫克/膠囊 (Rifampin® 300mg Cap)

瑞比新膠囊 300 毫克/膠囊 (Rifampicin® 300mg Cap)

☞ 藥品作用

本品為殺菌性抗生素。適用肺結核、奈瑟氏腦膜炎球菌帶原者的治療。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 600 毫克。
2. 應於餐前至少 30 分鐘或餐後 2 小時服用，可以和其他的抗結核劑併服。
3. 應按照醫師指示將療程服用完畢，不可突然停藥或自行增量或減量。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**肝臟疾病**、酒精中毒患者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是口服**避孕藥**、口服**抗凝血劑**、人類**免疫不全病毒藥品**。
3. 服用膠囊時建議多喝水。
4. 服用本藥品期間，**不建議併用酒精**。
5. 本藥若與口服**避孕藥**併用，請使用其他**避孕方法**。
6. **可能會出現橘紅色尿液或淚液**（若有配戴隱形眼鏡可能會著色）。
7. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、食慾不振、類感冒症狀等現象，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回

8. 如果有下列症狀，請立刻就醫：

- A. 寒慄、呼吸困難、暈眩、頭痛、肌肉及骨骼疼痛。
- B. 不明原因的發燒。
- C. 過敏反應（搔癢或蕁麻疹、臉部或手部水腫、嘴部或喉嚨水腫、胸悶）。
- D. 排尿次數或尿量大為降低、異常瘀傷或出血、眼睛眼白處變黃。

9. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。