



藥物成分	劑型	櫃號
Neomycin/ Betamethasone	眼用藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-313		

☞ 藥品商品名及含量

眼科用臨得隆複合液 1 mg/ml, 5 毫升 (Rinderon-A Solution)

賜眼康點眼液 1 mg/ml, 5 毫升 (Sencort ophthalmic Solution)

☞ 藥品作用

治療眼睛細菌感染，有抗發炎及抗過敏的療效。

☞ 使用方式

1. 通常每天點眼睛 3-5 次，每次 1-2 滴。
2. 使用前先清潔手部，頭部微向後傾，並輕拉下眼瞼，將藥水滴在下眼瞼內。閉上眼睛約 30 秒，可以壓住內眼角 1-2 分鐘，防止藥水經由鼻淚管流進喉嚨。
3. 請依照醫師指示使用，不可自行調整劑量或增加次數。若不慎忘記，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是糖尿病、抗生素過敏史。
2. 中耳炎、耳膜穿孔者請勿耳內使用。
3. 需避光冷藏 2~8°C 保存。
4. 用藥期間，請定期監控眼壓。
5. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。