



| 藥物成分 | 劑型 | 櫃號 |
|-------------------------------|------|----|
| Calcium Polystyrene Sulfonate | 口服粉劑 | |
| 版本：TPE202309 / 檔號：2023-094 | | |

☞ 藥品商品名及含量

加利美粉 5gm/包 含鈣 7-9% (Kalimate Powder)

鉀利安粉 5gm/包 含鈣 7-9% (Chalian Powder)

☞ 藥品作用

降低急性或慢性腎不全所伴隨之高血鉀症。

☞ 服用方式

1. (1)口服：成人每日 2~3 次，每次 3~6 包，每次用水 30~50ml 懸濁口服，依症狀增減。

(2)注腸：成人一次 6 包，用 100 毫升的水或 2% Methylcellulose 或 5% 葡萄糖溶液懸濁，加溫至體溫程度注腸後置於腸管內 30~60 分鐘。

如藥液外溢時以枕頭墊高臀部或暫時採膝胸臥姿。

2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是便秘、腸管狹窄、消化道潰瘍、副甲狀腺機能亢進、多發性骨髓瘤。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是強心藥 digoxin、含有鎂、鋁、鈣之制酸劑或緩瀉劑，如 MgO[®] 氧化鎂錠。

3. 請勿與果汁(含鉀量高)混合使用。

4. 常見副作用：便秘、食慾不振、噁心、低血鉀等，但一般

都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重便秘、持續腹痛、嘔吐、低血鉀症狀(精神混亂、無法正常思考、肌肉無力麻痺)、過敏症狀(皮膚紅疹、臉部手部浮腫、胸悶、呼吸困難)。
6. 目前對胎兒的風險不明，但臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。