

藥物成分

劑型

櫃號

Beclomethasone/
Formoterol噴霧
吸入劑

版本：TPE202309 / 檔號：2023-532

☞ 藥品商品名及含量 肺舒坦定量吸入劑 100/6 微克/劑量 (Foster)

外
盒外
觀

☞ 藥品作用

抗發炎及擴張支氣管平滑肌，能減輕病人的症狀與惡化程度。
用於氣喘、慢性阻塞性肺病患者。

☞ 使用方式

通常每日 2 次，每次吸入 1 或 2 劑。

初次使用吸入器，或吸入器未使用超過 14 天，先噴 1 劑藥物至空氣中，以確保吸入器正常作用。

吸氣時，身體應儘可能保持直立的姿勢。

開




1. 打開保護蓋，檢查吸入口是否乾淨，若有需要可接上吸藥輔助器。

吐



2. 將吸入器直立置於拇指與食指之間，拇指在下。避開藥物吸口，慢而深地吐氣。

吸

3. 嘴唇含緊吸入口。用口慢而深地吸氣 4-5 秒，一邊用食指按下吸入器頂端以釋出藥物。

閉

閉氣 10 秒



4. 吸藥後，嘴巴移開吸入口，閉氣 10 秒，即可恢復正常呼吸。完成吸藥後請漱口。

若需要再吸第二次，保持吸入器呈垂直狀態約半分鐘，再重複步驟 2 至 4。每次吸入器使用後，蓋上保護蓋。

注意事項

1. 本藥為混合水溶液劑型(非懸浮液)，不需搖晃即可使用。
2. 吸氣後若有凝霧狀況，不論從吸入器或患者口中出來，均應從步驟 2 開始，重新操作。
3. 手部無力的患者，宜以雙手同時握住吸入器；因此，食指應放在吸入器金屬罐的頂端，兩支拇指則撐住吸入器底部。
4. 每次使用完後請以清水漱口或者刷牙。
5. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是甲狀腺毒症、糖尿病、心血管疾病：心律不整、主動脈瓣狹窄、心肌梗塞、缺血性心臟病、鬱血性心臟衰竭、動脈硬化、動脈性高血壓。
6. 即使沒有症狀，仍應按照處方每天使用 Foster。
7. 每日維持劑量上限為 1 天 4 劑。緩解用的 Foster 應於出現氣喘症狀時使用，但不可作為例行性的預防，例如不可在運動前使用。例行性的預防應考慮使用其他短效型支氣管擴張劑。
8. 目前懷孕或哺乳方面的安全性資料仍欠缺，故除非醫師評估使用的益處大過於風險才可使用。

清潔方式

自吸入口拆下保護蓋，然後以乾布擦拭吸入口的內外；禁止使用清水或其他液體來清潔吸入口。使用吸藥輔助器者，以溫水沖洗輔助器後陰乾即可。

如何觀測剩餘藥量

本藥瓶身有計數視窗，若數字呈現 0 時，請更換一瓶。

保存方式

1. 領藥前存放於冰箱(2-8°C)，領藥後，只要儲存於室內陰涼處即可，在室溫下可存放 3 個月。
2. 金屬罐內含高壓液體，請勿暴露於溫度高於 50°C 的環境，亦不得在金屬罐上打洞。