



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Glecaprevir/ Pibrentasvir</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／櫃號：2023-227		

## ☞ 藥品商品名及含量

艾百樂膜衣錠 100 及 40 毫克/錠 (Maviret F.C.)

## ☞ 藥品作用

治療12歲(含)以上病人慢性C型肝炎病毒(HCV)基因型1、2、3、4、5、或6之感染。

## ☞ 服用方式

1. 每日1次，每次隨餐服用3粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。
3. 如果在預定服藥時間，漏服 Maviret 且未超過 18 小時，請儘快隨餐服用錯過的劑量，並依據一般服藥時間服用下次劑量。如果漏服 Maviret 已經超過 18 小時，請不要服用漏服的劑量，直接依據一般用藥時間服用下次劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾經感染 B 型肝炎病毒、有 C 型肝炎以外的肝臟疾病、HIV-1 感染、肝腎移植的病史及糖尿病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗病毒 atazanavir、efavirenz、降血脂 simvastatin、抗凝血 dabigatran、含荷爾蒙 ethinyl estradiol 製劑、抗生素 rifampicin、抗癲癇 carbamazepine 或金絲桃草。
3. 糖尿病病人於用本藥品治療期間密切監測血糖，並留意是否出現低血糖症狀。若發生低血糖症狀，請就醫由醫師評估是否需調整糖尿病用藥。
4. 如果您曾經感染 B 型肝炎病毒，在接受 Maviret 治療 C 型肝炎病毒期間或完成治療後，B 型肝炎病毒有可能再度活化。B 型肝炎病毒再度活化可能導致嚴重的肝臟問題，包括肝衰竭甚至死亡。如果您有 B 型肝炎病毒再度

活化的風險，醫護人員在您接受 Maviret 治療期間或完成治療後，會進行監測。

5. 常見副作用為頭痛、倦怠和噁心，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮膚發疹、發癢)；肝功能惡化(噁心、食慾降低、疲倦、胃腸不適、茶色尿、皮膚或眼白變黃)。
7. 目前尚不清楚 Maviret 是否會傷害未出生的胎兒。女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。
8. 目前尚不清楚 Maviret 的成分是否會分泌至人類乳汁中、影響母乳分泌或哺乳的嬰兒。有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。