



藥物成分

劑型

櫃號

Fenoterol

噴霧
吸入劑

版本：TPE202309 / 檔號：2023-594

☞ 藥品商品名及含量

備勞喘定量噴霧液 100 微公克/每噴 200 噴/罐
(Berotec N Metered Aerosol)

外
盒外
觀

☞ 藥品作用

本藥可預防和治療支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、氣腫或伴隨支氣管痙攣之肺支氣管障礙。主要用於緩解急性氣喘發作。

☞ 使用方式

在新的定量噴霧液裝置開始用前，要先下壓活塞2次，確定有白色霧狀氣體噴出。

之後每次劑量皆按照下列步驟使用：


1. 先移去
口含器
的護蓋



2. 將噴霧劑上下
搖晃使藥品混
合均勻



3. 朝旁邊深
深吐完肺
中氣體



4. 含住口含器，
按壓一下後以
**正常速度慢慢
深深地吸氣**



5. 之後閉氣 5~10 秒鐘，再慢慢地由口呼氣後，就可正常呼吸(如需吸入第 2 次劑量，請間隔 **30~60 秒**後再重複一次步驟 2~5，不可連續按壓兩次)

☞ 注意事項


1. 請依照醫師指示使用本藥品，通常每次 1~2 個定劑量，**每天不得吸入超過 8 個定劑量**。
2. 急性氣喘發作時，若吸入一個定劑量 5 分鐘後，呼吸沒有明顯改善，可投與第二個劑量；若呼吸狀況仍未改善，可能需要再投與數個劑量，此時應立即請教醫師/藥師或就近送醫。
3. 常見副作用為骨骼肌輕微震顫及精神緊張、頭痛、暈眩、心跳過速及心悸等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

☞ 清潔方式

1. 先取下口含器的護蓋，並移去吸入器中的藥罐。
2. 用溫水清洗吸入器。(如圖一)
3. 清洗完請甩乾吸入器後**請陰乾**，切勿用任何加熱裝置烘乾。(如圖二) 待全部乾燥後在裝上藥罐及護蓋即可。



(圖一)



(圖二)

☞ 如何觀測剩餘藥量

此藥無指示視窗可供觀測剩餘量，請諮詢藥師如何記錄使用量(需人工紀錄)。