



藥物成分

劑型

櫃號

Tramadol

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-783

☞ 藥品商品名及含量

克能達舒敏膠囊 50 毫克/膠囊 (Tramal)

派頓頓痛特膠囊 50 公絲/膠囊 (Tramtor)

☞ 藥品作用

治療中度至嚴重的急、慢性疼痛。

☞ 服用方式

1. 通常一日 3 次，每次 1~2 粒(依醫師指示)與水一起服用、飯前飯後皆可。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對 tramadol 或鴉片類藥物過敏、高碳酸血症、急性或嚴重氣喘、腎臟疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是單胺氧化酶抑制劑(MAOI)、鴉片類藥物。
3. 12 歲以下兒童不建議使用本藥。
4. 如果連續服用一段期間之後請遵照醫師指示慢慢減量，突然停藥可能引發戒斷症狀(疼痛反彈性增加)。
5. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
6. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性降低，屬易跌倒藥品，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械，服藥期間也應特別注意。
7. 常見副作用為發汗、倦怠、暈眩、噁心、嘔吐、便秘、口乾，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
8. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心跳過快、皮膚紅疹、肌

肉顫抖、呼吸困難、極度興奮、精神沮喪。

9. 對於人類懷孕期間使用本品安全性的研究證據仍不足夠。在生產前或生產時使用本品，不會影響子宮收縮能力但可能會改變新生兒呼吸速率。懷孕期間長期使用可能會造成新生兒戒斷症候群，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。