



藥物成分

劑型

櫃號

Doxycycline

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-172

☞ 藥品商品名及含量

多士林膠囊 100 毫克/膠囊 (Doxycycline)

得喜寧膠囊 100 毫克/膠囊 (Doxynin)

☞ 藥品作用

治療革蘭氏陽性菌、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症。

☞ 服用方式

1. 通常一天服用 1-2 次，每次 1 粒。飯前飯後服用皆可，如果出現腸胃刺激的狀況，請搭配食物一起服用。
2. 請搭配足夠的開水服用，以防止食道刺激或潰瘍，就寢前服用尤須注意。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是懷孕或腎、肝功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 兒童請遵照兒科醫師指示使用本藥物。
4. 本藥與奶製品(如：牛奶)或礦物質補充劑(如：鈣片、鐵劑、鎂鋁粉)或制酸劑類胃藥須隔開 2 小時服用。
5. 本藥會降低口服避孕藥的藥效，當服用本藥時必須採取其它的避孕方法。
6. 可能會有曬太陽產生的過敏(如：紅疹)，服藥期間請避免過度曝曬陽光，並穿戴長袖衣物、太陽眼鏡及塗防曬油等。
7. 即使症狀改善也請確實按醫囑服藥完畢，確實完成療程避免讓細菌對抗生素產生抗藥性。

臺北市立

8. 可能的副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、陰道搔癢或口內炎，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。如果有下列症狀，請立刻就醫：不明且嚴重的皮疹、呼吸或吞嚥困難、臉部或喉嚨腫脹。

9. 本藥可能會傷害胎兒，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，服用本藥期間亦不建議哺餵母乳。