



藥物成分

劑型

櫃號

Ruxolitinib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-386

## ☞ 藥品商品名及含量

捷可衛錠 5 毫克/錠、15 毫克/錠劑 (Jakavi Tablets)

## ☞ 藥品作用

治療骨髓纖維化。

## ☞ 服用方式

1. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。
2. 請整粒吞服，可隨餐或空腹服用，固定時間即可。
3. 無法吞服的病人，可將錠劑溶於 40 毫升開水攪拌 10 分鐘後使用，灌食後再以 75 毫升水沖洗鼻胃管。藥錠溶解後，必須於 6 小時內使用。
4. 若接受透析治療，請於每次透析結束後使用本藥品。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎臟疾病、肝臟疾病、高膽固醇血症、感染性疾病、結核病或皮膚癌病史，或是正在接受透析治療。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 服藥期間，請定期監控血脂肪。
5. 常見副作用為貧血（紅血球數目降低）、血小板數目降低（血小板減少），因此治療前及期間會執行血液檢驗，藉此評估您的最佳起始劑量；可能會需要調整劑量或輸血跟血小板。
6. 若出現以下症狀請立即就醫：
  - (1) 過敏反應：蕁麻疹、眼睛及嘴巴周圍腫脹或刺痛、皮膚搔癢、胸痛、喘、呼吸困難、皮膚疼痛伴隨水泡。

(2) 嚴重感染症狀：發燒、排尿疼痛、傷口難以癒合、帶狀皰疹。

(3) 異常出血：出血或瘀傷、吐血、黑便、傷口裂開或癒合情況不佳。

(4) 皮膚癌症狀：痣的顏色或尺寸有改變、皮膚出現異常突起。

(5) 神經學症狀：視力模糊、意識混亂、記憶喪失、行為改變、失去平衡、喪失語言能力。

7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，懷孕婦女不建議使用本藥，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

8. 本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。