

藥物成分

劑型

櫃號

Afatinib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-014

## ☞ 藥品商品名及含量

妥復克膜衣錠 30 毫克/錠、40 毫克/錠(Giotrif Film Coated Tablets)

## ☞ 藥品作用

本藥用於治療局部晚期或轉移性之非小細胞肺癌。

## ☞ 服用方式

1. 每天服用一次，請盡量於固定時間服用，應配以開水整粒吞服。
2. 如病人無法吞服整粒錠劑，可將藥錠放入約 100 毫升的開水中(不要壓碎)，攪拌約 15 分鐘直到錠劑崩散成極小的顆粒，立即喝下此溶液，再以 100 毫升的開水沖洗杯緣並喝下。此溶液也可用鼻胃管餵食。
3. 本藥需空腹服用，服藥前 3 小時與服藥後 1 小時內請勿進食。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，應在同一天內想起時立刻補服，若是離下次服藥時間不足 8 小時，則跳過該次劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝臟、肺臟或心臟疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 Amiodarone, Carbamazepine, Erythromycin, Itraconazole, Phenobarbital, Phenytoin, Rifampicin, Verapamil 及消炎止痛藥或類固醇等。
3. 如果同時使用抗凝血劑(Warfarin)，可能會增加出血的機會，請配合醫師定期檢查凝血功能。
4. 本藥可能造成光敏感與皮膚紅疹，皮疹/瘡瘡可能發生在日曬部位，或在日曬後惡化。請適當防曬並避免陽光過

5. 可能會產生無症狀的肝功能指數上升，請配合醫師回診定期檢查。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸困難、咳嗽、發燒或出現、嚴重腹瀉、嚴重皮膚疹、血便或黑便、視覺模糊或暫時性眼盲、嚴重胃痛、嚴重胸痛、黃疸等。
7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示治療期間應避免懷孕，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 男性及女性皆需在服藥期間和服用最後一劑之後兩週內，須進行適當避孕措施。
9. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。