



藥物成分

劑型

櫃號

Quetiapine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-368

☞ 藥品商品名及含量

思樂康膜衣錠 25 毫克/錠、100 毫克/錠 (Seroquel F.C. Tablet)

東健膜衣錠 25 毫克/錠 (Epine F.C. Tablet)

優達平膜衣錠 100 毫克/錠 (Utapine F.C. Tablet)

思樂康持續性藥效錠 50 毫克/錠、200 毫克/錠 (Seroquel XR Tablet)

美加柔持續性藥效膜衣錠 50 毫克/錠 (Megazon PR Tablet)

康思寧持續性藥效錠 200 毫克/錠 (Q-pine XR Tablet)

☞ 藥品作用


用於思覺失調症、雙極性疾患之躁症發作治療。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。

☞ 服用方式

1. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是胃腸疾病、乳癌、癲癇、尿滯留、肝功能不良、心律異常。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗癲癇藥、紅黴素、抗黴菌藥、情緒穩定劑、降血壓藥。
3. 常見副作用為嗜睡、頭暈、口乾、輕微無力、便秘、體重增加、姿態性低血壓，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：史蒂文生強生症候群(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫

- 
- 抖、肌痛或噁心嘔吐等)、錐體外徑症狀(肌肉痙攣/無力、伸舌頭)、男性女乳症(溢乳)、心律異常、癲癇。
5. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
 6. 服藥期間由坐或躺的姿勢要站起來時，請慢慢地移動，以避免姿勢變化太快，造成頭暈而跌倒。
 7. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
 8. 精神疾病本身就伴有自殺的風險增加。開始接受本藥治療的病人，不拘年齡，都應受到適當的監視，並且密切觀察有無臨床症狀惡化、自殺或不尋常的行為改變。
 9. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
 10. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。