

藥物成分

劑型

櫃號

Povidone-Iodine

外用液

版本：TPE202309／檔號：2023-710

- ☞ 藥品商品名及含量(以下相當於 10mg 有效碘)  
 "成大"好碘液 10mg/ml, 100mL (Good-Iodine Solution)  
 "維星"安碘液 10mg/ml, 100mL (Andine Solution)

### ☞ 藥品作用

用於手術前、穿刺前的皮膚或黏膜之消毒。亦可用於緊急處理擦傷、切傷、刺傷、抓傷等導致皮外傷口及傷口周圍的洗淨、消毒、殺菌來防止傷口感染。

### ☞ 使用方式

以棉棒或棉球沾藥水塗於患部。可一天多次使用。建議使用後保持塗抹部位透氣。可經稀釋或以未稀釋的方式供潤溼或清洗使用。不同用途其稀釋程度各不相同，請向醫師或藥師諮詢。

### ☞ 注意事項

1. 曾因本藥成分引起過敏的人請勿使用。
2. 本藥不得內服，不得用於眼睛四周或其他黏膜位置(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。萬一誤入眼睛，請立刻以水沖洗，並前往眼科就醫。
3. 三歲以下兒童或有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷與嚴重燒燙傷者，使用前請洽詢醫師診治。
4. 可能使孕婦及其胎兒及哺乳婦造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。哺餵母乳時，應注意不要讓嬰兒嘴巴靠近用藥部位。
5. 會使皮膚或衣物染色，可利用溫水與肥皂清除。
6. 本藥勿用於大面積體表(以勿超過使用者的兩個手掌為標準)。
7. 如果有下列症狀，或使用 7 天後無改善或更惡化，請立刻就醫：血壓下降、呼吸急促、冒冷汗、浮腫、手腳冰冷、脈搏加快或躁動感、皮膚起水泡、口中有金屬味、唾液增

加、口腔或喉嚨有灼燒感等現象。

8. 藥品保存於 25°C 以下，避免陽光直射，並存放於兒童不易取得之處所。若本藥嚴重褪色，請勿繼續使用。
9. 不建議長期使用。