

藥物成分

劑型

櫃號

Axitinib

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-041

## ☞ 藥品商品名及含量 抑癌特膜衣錠 5 毫克/錠 (Inlyta)

☞ 藥品作用  
治療已接受過sunitinib或cytokine治療失敗的晚期腎細胞癌 (Renal cell carcinoma, RCC)病患。

☞ 服用方式

1. 建議起始口服劑量為 5 毫克，每日兩次，兩次劑量間隔約 12 小時。
2. 可與食物併服，亦可不與食物併服。
3. 應以一杯水整顆吞服。
4. 如果病人嘔出藥物或漏服一劑藥物，不可額外多服用一劑。應按照平常的時間服用下一劑處方劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝臟、心臟疾病、甲狀腺功能異常、高血壓、出血或血栓問題，請告知您的醫師。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗病毒藥或是抗黴菌藥物，避免出現藥物交互作用。
3. 服藥期間請定期監測血壓情形，藥物可能使血壓升高，在使用此藥之前應先控制好血壓；如有要開刀或拔牙，請事先告訴醫師或牙醫師您正在服用此藥。
4. 應定期監測肝功能、甲狀腺功能，以及是否出現蛋白尿、胃腸穿孔或瘻管的症狀。
5. 常見副作用為腹瀉、高血壓、疲倦、食慾降低、噁心等，一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受，請回診與醫師討論。
6. 此成分可能對胎兒造成傷害，治療期間至服用最後一劑藥物後 1 週為止，應使用有效避孕方式，若計畫懷孕或

臺北市立

聯合醫院

已懷孕請告知您的醫師。

7. 本藥分泌到母乳的量不明，治療期間至服用最後一劑藥物後2週為止應避免哺乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。