

藥物成分

劑型

櫃號

Sodium  
Fluoride

外用液

版本：TPE202309／檔號：2023-751

## ☞ 藥品商品名及含量

塗樂氟牙科用懸液劑 5%/10 毫升 (Duraphat Dental Suspension)

## ☞ 藥品作用

局部使用氟化物在牙齒表面，使牙齒更堅固，保護牙齒防止蛀牙。

## ☞ 使用方式

1. 對齲齒的預防，通常每 6 個月重複使用，亦可較頻繁地每 3 個月使用 1 次。對過敏性牙齒，可於數天內塗抹 2 或 3 次。
2. 使用後 4 小時內，勿刷牙或咀嚼食物。
3. 本品限由牙醫師使用。使用前，應先刮除過量的牙菌斑，並吹乾牙齒。以刷子、探針或拭棉將本品薄薄地塗抹於整口齒列或於敏感的齒列上。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對 colophony 或其他成份過敏、潰瘍性牙齦炎、口腔炎、支氣管氣喘。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是高劑量含氟製劑，如：氟膠。使用本品後，應暫時停用氟補充物。
3. 勿於空腹時塗抹本品於整口齒列。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：口腔黏膜水腫性腫脹、潰瘍性牙齦炎、口腔炎現象。
5. 因本品含 33.8% 的酒精，故建議孕婦、哺乳婦應避免使用。女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。