



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Ergotamine/ Caffeine</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-189		

## ☞ 藥品商品名及含量

痛安錠 1+100 毫克/錠 (Ergocafe)

"強生"易克痛膜衣錠 1+100 毫克/錠 (Ergoton F.C.)

## ☞ 藥品作用

本藥可使末梢血管收縮，可緩解血管性偏頭痛發作時的症狀。

## ☞ 服用方式

急性發作時請先服用兩粒，之後若症狀無法緩解可半小時服用一粒（醫師可能會依個人狀況調整用法），**但一天最多服用6粒，每周累計最多10粒。**

請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。

**本藥只做為急性發作時的緩解，不可用來預防之用。**

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**咖啡因或麥角鹼過敏、末梢血液循環不良、冠心病、動脈炎、肝腎功能不良。**
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他血管收縮劑、巨環類抗生素、抗 HIV 藥物、抗黴菌藥。
3. 服藥期間請**避免大量吸菸**，可能會增加副作用發生；也請**避免飲酒**，酒精可能會導致頭痛惡化。
4. 本藥須保存在乾燥陰涼處，並確保他人或幼童不會誤食。
5. 本藥含**咖啡因(100 毫克)**，請注意飲食避免咖啡因攝取過量。
6. 常見副作用為**暈眩、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、心搏變**

快或變慢、四肢麻木或肌痛、虛弱，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：胸悶或胸痛、手或腳指刺痛、皮膚出疹/紅斑(過敏症狀)、呼吸抑制、神智混亂、昏睡、暈眩、痙攣或休克。
8. 懷孕等級 X，孕婦及哺乳婦禁止使用，女性計畫懷孕或哺乳請事先告知醫師。