



藥物成分

劑型

櫃號

Ropinirole

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-382

☞ 藥品商品名及含量

力必平持續性藥效膜衣錠 2 毫克 (Requip P.D. Tablets)

☞ 藥品作用

治療帕金森氏症或是原發性腳部躁動症之用藥。

☞ 服用方式

1. 每日於固定時間服用一次，依醫師指示劑量服用，不可自行調整劑量或突然停藥。
2. 必須整顆吞服，不可剝半、磨粉。
3. 若出現噁心症狀，將藥品與食物一起服用，可能有助減少腸胃不適的發生。
4. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎功能異常、心血管疾病、精神疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是多巴胺拮抗劑(如 metoclopramide)、抑制 CYP1A2 藥物(如 ciprofloxacin、fluvoxamine)。
3. 請勿飲用酒類，酒精會增強中樞抑制作用。
4. 服藥期間，請定期監控血壓。
5. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
6. 常見副作用為緊張不安、噁心、周邊浮腫、頭暈、嗜睡、姿勢性低血壓，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)、精神病反應(妄想、偏執、精神錯

亂)、極度嗜睡。

8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有不良反應的紀錄，本藥不建議用於懷孕婦女，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥不可用於哺乳婦女，會抑制乳汁分泌。