



藥物成分

Midodrine

劑型

口服藥

櫃號

版本：TPE202309／檔號：2023-298

☞ 藥品商品名及含量

邁妥林錠 2.5 毫克 (Midorine Tablets)

脈索林錠 2.5 毫克 (Vasorine Tablet)

☞ 藥品作用

提升血壓。

☞ 服用方式

1. 此藥劑量因疾病而有不同，針對循環失調每次 1 粒，早、晚服用；針對尿失禁每次 1-2 粒，每天 2-3 粒。
2. 正在服用鎮定劑或催眠劑的病人，使用本品之起始劑量應為每次 1 粒，每天 2 次，若需要，劑量可增至每次 2 粒，每天 2-3 粒。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是高血壓，腎上腺髓植瘤(嗜鉻性細胞瘤)，急性腎炎，嚴重腎功能不足，青光眼，已形成尿殘留之攝護腺肥大，排尿機械性阻塞，甲狀腺機能亢進症等等，不可服用本藥品。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 α -阻斷劑，如：Prazosin、Phentolamine 或 Reserpine，Atropine，Cortisone，強心配醣體(毛地黃製劑)。
3. 常見副作用為高血壓(尤其是平躺時)、心搏過緩、起雞皮疙瘩、皮膚搔癢、排尿困難(如頻尿、尿急、尿滯留)、感覺異常等等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

4. 有關常見副作用高血壓，經常發生在當您平躺時，建議您躺下時需要把頭墊高，以避免血壓過高的問題。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)、心律不整、血壓過高等等。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。
8. 本藥品作用在提升血壓，請每日定時測量及記錄血壓。