



藥物成分	劑型	櫃號
Canagliflozin	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-095		

## ☞ 藥品商品名及含量

可拿糖膜衣錠 100 毫克 (Canaglu Tablet)

## ☞ 藥品作用

將血中過多的葡萄糖排泄至尿液中以治療第二型糖尿病。

## ☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是重度酮病(ketosis)、糖尿病性昏迷或昏迷前期、重度感染、手術前後、有嚴重外傷、急性腎損傷病人、ESRD 或透析。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是強心藥 digoxin、胰島素製劑、硫醯基尿素類(Sulfonylurea)或速效型促胰島素分泌藥物。
3. 應適時補充水分及維持個人衛生，以預防體液流失造成的低血壓和泌尿道感染。
4. 常見副作用：無症狀低血糖、低血糖、頻尿、血中酮體增加、便秘等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(紅疹、蕁麻疹、臉部/嘴唇/喉部腫脹、呼吸困難、黏膜破或疼痛)、腎功能異常症狀(排尿困難、血尿、尿量急劇改變)、泌尿道感染(如血尿、排尿疼痛、發燒、骨盆疼痛或下腹疼痛)、生殖器感染(如陰道有滲出物或搔癢、陰莖/龜頭疼痛、腫脹、

出疹或有滲出物)。

6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。