

藥物成分	劑型	櫃號
Extract Glycyrrhiza/ Tincture opium camphor/ Potassium antimony tartrate	口服液	
版本：TPE202309／檔號：2023-074		

☞ 藥品商品名及含量

複方甘草合劑液 120 毫升/瓶 (BROWN MIXTURE LIQ.)

甘草止咳水 120 毫升/瓶 (LIQUID BROWN MIXTURE)

☞ 藥品作用

鎮咳、祛痰。

☞ 服用方式

本藥需由醫師處方使用。

用法用量：口服，常用劑量2-10ml，依年齡遞減。

☞ 藥品儲存

1. 本品應置於兒童伸手不及之處。
2. 避光、密封，貯存於陰涼處(30°C以下)。
3. 久置偶有沈澱，服前搖勻

☞ 注意事項

1. 本品對 1 歲以下嬰兒不宜長期使用。
2. 具成癮性，須慎重給藥勿超過建議劑量。
3. 不得併服含酒精飲料。
4. 服後偶有思睡、眩暈現象，應避免開車及操作機械。
5. 發疹、搔癢、過敏時，應即停藥。
6. 嚴重呼吸抑制的病患禁用、嚴重肝機能障礙、心肌不全的患者、急性酒精中毒患者均禁用。
7. 孕婦及哺乳婦：一般不建議給藥，除非醫療上必要。
8. 可能會有呼吸抑制、不整脈、血壓異常、思睡、不安、眩暈、興奮、發汗、視覺模糊、噁心、嘔吐、便秘等現象產生，若有發生症狀時，請立即停止使用，請洽醫師診治。