



藥物成分

劑型

櫃號

Ribociclib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-727

☞ 藥品商品名及含量

擊癌利 200 毫克/錠 (Kisqali)

☞ 藥品作用

用於治療乳癌。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 3 錠，連續 21 天，之後暫停治療 7 天，一個完整療程共計 28 天。
2. 建議每天同一時間服用，最好在早晨。
3. 藥錠應整顆吞服，若裂開、破碎或不完整，請勿服用。
4. 如果患者在服藥後嘔吐或錯過一劑，當天不需補服另一劑，應根據正常服藥時間服用下一劑。
5. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**肝腎功能疾病、心臟、肺部疾患**。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的其他藥物，特別是**抗生素、抗病毒藥、抗癲癇藥、抗心律不整藥**。
3. 服用本藥期間，不應食用葡萄柚或喝葡萄柚汁、石榴或石榴汁。
4. 常見副作用為噁心、倦怠、腹瀉、脫髮、嘔吐、便秘、頭痛、背痛。但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**心律不整、昏厥、呼吸困難、胸痛、皮膚起水泡或黏膜潰瘍的皮膚紅腫**。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中具有生殖毒性，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不應哺乳。