



藥物成分	劑型	櫃號
Mecobalamin	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-659		

☞ 藥品商品名及含量

彌可保膠囊 500 微公克/膠囊 (Methycobal)

美可敏膠囊 500 微公克/膠囊 (Mecomin)

☞ 藥品作用

本品為維生素B₁₂同族中甲基轉移反應重要之物質，參與核酸及核蛋白之合成，賦活氨基酸蛋白質之代謝、生合成，由此可使神經細胞中之核酸蛋白代謝促進輾轉反應而得改善。以動物實驗本品可使神經變質部位之燭集細胞分裂，促成髓鞘的形成，又對動物實驗其過敏性腦炎及神經炎之引發過程中若投與本品因具有修復神經組織之作用，可抑制腦細胞之退化變性及發炎。

☞ 服用方式

1. 通常每日 3 次，每次 1 粒。可依年齡及症狀適宜增減。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 使用過後，若無效果顯現時，不必做為長期之使用。
2. 從事長期處理水銀及其相關化合物者應避免大量投予本藥。
3. 本藥受光照後可能使藥品主成分減少，將藥品儲存在室溫，遠離高溫、高濕度(不要放在浴室)和直接的陽光照射。
4. 常見副作用為胃部不適感、食慾不振、噁心、下痢或者偶爾出現腹部疼痛等之症狀，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有發疹之過敏症狀，請立刻停藥並就醫。
6. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。