



藥物成分	劑型	櫃號
Tetrabenazine	口服藥	

版本：TPE202309／流水號：2023-417

☞ 藥品商品名及含量

止蹈錠 25 毫克/錠 (Xenazine)

☞ 藥品作用

用於治療亨汀頓舞蹈症之舞蹈症狀。

☞ 服用方式

請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否會對 Tetrabenazine 過敏。
2. 若有憂鬱症、自殺傾向或肝臟疾病請告知醫師，由醫師評估是否可使用。
3. 服藥期間若有憂鬱或憂鬱加重、自殺傾向、煩躁不安、緊張、恐慌、情緒或行為改變等突發或惡化情形，務必告知醫師。
4. 服用 Tetrabenazine 可能影響駕駛或操作機械，須留意自身的精神狀況。
5. Tetrabenazine 導致的副作用並不常見，但還是可能發生。若有以下症狀發生嚴重的情形或是無法忍受，請盡快告知您的醫師：嗜睡、疲勞、失眠、靜坐不能、焦慮、憂鬱、胃腸不適、過敏等。
6. 孕婦用藥等級：C。若您已懷孕，就診時請務必告知醫師並告知週數。若您計畫懷孕，就診時請務必告知醫師。
7. Tetrabenazine 可能分泌至乳汁，若您有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。