



藥物成分	劑型	櫃號
Lovastatin	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-658		

☞ 藥品商品名及含量

舒脂錠 20 毫克/錠 (Delipic)

路脂定錠 20 毫克/錠 (Lozutin)

☞ 藥品作用

本藥可減慢體內膽固醇的生成，主要用來治療高膽固醇血症及高三酸甘油酯血症，減少發生心血管疾病或中風的機會。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒，晚飯後或睡前服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝臟或腎臟方面的疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物(包含健康食品)，特別是抗凝血劑 warfarin、cyclosporine、erythromycin、HIV 藥物、抗黴菌藥 itraconazole、或其他降血脂藥。
3. 服藥期間請勿飲酒，酒精可能會加重此藥之副作用。
4. 副作用相當少見，但有可能發生：頭痛、消化不良、噁心，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：若出現眼睛/皮膚變黃、茶色尿液(黃疸)、右上腹疼痛、不明原因的肌肉疼痛、肌肉無力或痙攣，尤其伴有全身不適、虛弱或發燒的現象。
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。