



藥物成分

劑型

櫃號

**Sacubitril/
Valsartan**

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-387

☞ 藥品商品名及含量

健安心 49/51 毫克/錠、97/103 毫克/錠 (Entresto F.C. Tablets)

☞ 藥品作用

治療慢性心臟衰竭

☞ 服用方式

1. 起始劑量為每日兩次，每次 100 毫克，後依醫師指示調整劑量。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝、腎功能不良者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是血管張力素受體拮抗劑類降血壓藥物、保鉀型利尿劑、消炎止痛藥
3. 服藥後可能有姿態性低血壓，若要起身站立時，應注意跌倒風險；使用期間請定時量測血壓，以利醫療人員評估與追蹤。
4. 常見副作用為低血壓、高血鉀、咳嗽、暈眩，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：持續乾咳、血管性水腫、高血鉀(手指嘴巴麻木、肌肉無力、胸悶、感覺喪失、心律不整)。
6. 資料顯示本藥有致畸胎的紀錄，懷孕婦女禁止使用，女

臺北市立

聯合醫院

性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。如果女性在用藥期間發現懷孕，應儘速停用本藥。

7. 本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。