



藥物成分

劑型

櫃號

Abrocitinib

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-457

☞ 藥品商品名及含量

喜繽果 200 毫克膜衣錠

Cibinqo 200mg F.C Tab (Abrocitinib)

☞ 藥品作用

適用於治療12歲以上患有中度至重度異位性皮膚炎且適合接受全身性治療的病人。

☞ 服用方式

1. 每日大約相同時間口服本藥品每日一次，可搭配或不搭配食物服用，錠劑應以水整粒吞服，不得切割、壓碎或嚼碎。
2. 在出現噁心的病人中，服用 Cibinqo 時搭配食物服用可能改善噁心。

☞ 不良反應

噁心、頭痛、痤瘡、單純皰疹、嘔吐、頭暈、上腹痛等

☞ 注意事項

1. 如果漏服劑量，建議病人應盡快服用，除非距離下一劑少於 12 小時，若是這種情況下則病人不必服用該漏服劑量。此後應繼續按照排定時間定期服藥。
2. 若治療期間需使用其他藥物，可能會影響 Cibinqo 的治療效果，請主動告知醫師或諮詢藥師。
3. 對 65 歲以上成人、12 歲以上青少年、腎功能不全的病人，全血球計數數值異常、高血脂症醫生會依照症狀調整藥物使用劑量。
4. 對活性成分或賦形劑(乳糖)過敏者、嚴重全身性感染(結核病)、重度肝功能不全、懷孕與哺乳為其禁忌症。
5. 服用 Cibinqo 感到頭暈之病人應該避免駕駛及操作機械。

☞ 其他注意事項

1. 建議具有生育能力的女性在治療期間及服用 Cibinqo 最

臺北市立

聯合醫院

後一劑後的 1 個月內需有效避孕。

2. 目前沒有正在接受 Cibirgo 之病人對於疫苗接種的反應資料，因此在治療期間或治療前不久應避免使用活性減毒疫苗。