



藥物成分	劑型	櫃號
Golimumab	注射劑	

版本：TPE202309／流水號：2023-232

☞ 藥品商品名及含量

欣普尼注射液 50 毫克/0.5 毫升 (Simponi)

☞ 藥品作用

本藥可調節免疫反應，可用於治療類風濕性關節炎、乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎、潰瘍性結腸炎、無放射影像確認之中軸性脊椎關節炎。

☞ 使用方式

1. 通常每月給藥一次，以皮下注射方式注射在腹部、大腿或上臂。本藥必須由醫療專業人員施打。
2. 避光儲存於冰箱冷藏處(2~8°C)，不可冷凍，不可振搖。
3. 如果忘記在計劃的日期注射，應於想起時盡快注射錯過的劑量，切勿注射兩倍的劑量以彌補錯過的劑量。如果錯過的劑量延遲 2 週以內，病人應注射所忘記的劑量並於其後依照原本的時程按時注射。如果錯過的劑量延遲超過 2 週，病人應注射所忘記的劑量並於注射當日開始一個新的注射時程表。

☞ 注意事項

1. 避光儲存於冰箱冷藏處(2~8°C)，不可冷凍，不可振搖。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是乳膠過敏、活動性感染（包括慢性及局部、伺機性感染）、結核病、B型肝炎、C型肝炎、神經系統問題（如：多發性硬化症）、惡性腫瘤、中度或重度心衰竭者。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是活體疫苗、anakinra、abatacept、sulfasalazine、生物性疾病修飾性抗風濕藥物(DMARDs)或其他生物製劑。
4. 常見副作用為注射部位反應（紅、腫、癢、痛）、上呼吸

道感染(如鼻竇感染)、頭痛、過敏反應、皮疹、噁心，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重過敏反應(嚴重皮疹、臉部腫脹、呼吸困難或休克)、感染症、身體部位有任何刺痛或麻木、手腳無力、視覺改變、眩暈、呼吸急促、下肢水腫。
6. 目前對胎兒的風險證據不足，但資料顯示動物實驗中沒有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。