

藥物成分

劑型

櫃號

Fluticasone

噴霧
吸入劑

版本：TPE202309 / 檔號：2023-603

- ☞ 藥品商品名及含量
輔舒酮優氣吸入劑 50 微公克/劑量
120 劑量/瓶 (Flixotide Evohaler)


H 用藥指導短片



- ☞ 藥品作用
對肺部具有抗發炎作用，用於預防性治療成人及兒童氣喘。

- ☞ 使用方式
1. 通常每日2次，每次1-2個劑量。
 2. 新的吸入劑第一次使用或超過一星期未使用之前，請充分振搖吸入劑，並且對空氣試噴兩下，以確定它可以使用。


- (1) 輕輕擠壓吸口蓋的兩側並移除吸口蓋。
- (2) 檢查吸入器內外，包含吸口是否乾淨。
- (3) 充分振搖吸入器並確保內容物已混合均勻。



- (4) 將吸入器直立置於拇指與食指之間，拇指放在底部，亦即吸口的下方。
- (5) 先把氣吐乾淨(盡可能的呼氣)，然後將吸口置於齒間，緊閉雙唇，但不要咬吸口。



- (6) 開始經口吸氣的同時，立即用食指在吸入器的上方往下壓一次以釋出藥劑噴霧，同時仍保持穩定且深深慢慢的吸氣動作。



- (7) 擷住呼吸並將吸入器移開口部，繼續擷住呼吸，時間愈久愈好，直到感到不舒服為止（建議最少閉氣5~10秒）。



- (8) 如果需要吸入更多次，則將吸入器繼續保持直立，大約等30秒後再重複步驟 3至步驟 7。
- (9) 之後，以清水漱口並吐出。
- (10) 使用後應將吸口蓋壓緊蓋好。

3. 清潔方式：吸入劑必須至少一個禮拜清潔一次。請勿將金屬罐放入水中。

- (1) 移開吸口蓋(不要將金屬罐自塑膠外殼中取出)。
- (2) 以乾布、面紙或棉布將吸嘴與塑膠外殼內外擦拭乾淨。
- (3) 將吸口蓋裝回去。

4. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整劑量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間用藥即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 ritonavir。
3. 不可突然終止輔舒酮優氟吸入劑的治療。
4. 常見副作用為口腔和喉部念珠菌感染及嘎聲，但在吸入藥劑後立即以水漱口可能可以預防，所以漱口是很重要的。
5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有致畸胎的紀錄 女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。