



藥物成分	劑型	櫃號
Anagrelide	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-032		

☞ 藥品商品名及含量

安閣靈膠囊 0.5 毫克/膠囊 (Agrylin)

安脈樂膠囊 0.5 毫克/膠囊 (Analide)

☞ 藥品作用

用於治療原發性血小板過多症。

☞ 服用方式

1. 起始劑量為每日四次每次 1 粒(0.5 毫克)或每日兩次每次 2 粒(1 毫克)，後依醫師指示調整劑量，達到目標維持劑量。
2. 肝功能不佳的患者，須調整使用劑量。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**肝功能不良**。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是影響血液凝結的藥物(如：Aspirin、Desvenlafaxine、Duloxetine、Milnacipran、Venlafaxine)及導致 QT 延長的藥物(如：Donepezil、Hydroxychloroquine、Lofexidine)。
3. 服藥期間，請定期監控全血計數、肝腎功能和電解質。
4. 常見副作用為頭痛、腹瀉、疲倦，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸急促、雙腿或踝腫大、嘴唇及皮膚呈藍色；胸痛、心悸、感覺自己心跳不規則；出血的徵象(如：吐血、血便或解黑便)。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間及最後一次服藥一週內不建議哺乳。