



藥物成分

劑型

櫃號

Tacrolimus

外用藥膏

版本：TPE202309／檔號：2023-760

## ☞ 藥品商品名及含量

普特皮軟膏 0.03% 10 公克 (Protopic Ointment)

## ☞ 藥品作用

本藥可抑制T淋巴細胞活化。用於治療2歲以上孩童、青少年及成人，對其他傳統治療(如外用的皮質類固醇)反應不充分或無法耐受的中度至重度異位性皮膚炎。

## ☞ 使用方式

1. 症狀發作期通常每日 2 次，薄薄塗抹於患部上，並勿以閉合性敷料覆蓋其上。倘若症狀在兩週內未見好轉，應回診請醫師評估其他治療方式。
2. 維持治療通常每週 2 次(例如星期一與星期四)，或間隔 2~3 天塗抹一次，以避免病灶惡化復發。
3. 若要使用保濕劑，應先諮詢醫師，並於塗抹完本藥後間隔 2 小時再使用。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是近期曾皰疹發作、少見的皮膚屏障缺陷疾病(如層狀魚鱗癬、全身性紅皮症等)。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌藥物、免疫抑制劑、抗人類免疫缺乏病毒藥物。
3. 用藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施。
4. 長期(數年)的使用可能造成感染或皮膚惡性病變，應依照醫囑避免長期使用。本藥不可塗抹於可能為惡性或癌前病變的病灶。
5. 若雙手非治療部位，使用藥品後應清潔雙手。避免有藥品接觸眼睛與黏膜，若不慎塗抹至這些部位，應徹底擦掉軟膏並以清水沖洗。
6. 常見副作用為塗藥部位刺激不適(灼熱感、搔癢、紅斑)，但

一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

7. 懷孕：目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，懷孕期間不得使用本藥，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。哺乳：本藥可能會分泌到母乳裡，用藥期間不建議哺乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。
8. 本藥應保存於 25°C 以下。