



藥物成分	劑型	櫃號
Naftifine HCl	外用藥膏	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-674		

☞ 藥品商品名及含量

健將乳膏 10 毫克/克 (Genaf cream)

安舒黴乳膏 10 毫克/克 (Anzumei Cream)

☞ 藥品作用

本藥為局部抗黴菌劑，適用於髮癬菌種、小芽胞癬菌種、毛絮狀表皮黴癬菌在皮膚及其附屬組織所引起之感染、表皮念珠菌病、甲黴菌病、花斑癬。

☞ 使用方式

1. 使用前後請用肥皂清水洗淨雙手。
2. 患部(皮膚或指甲)在用藥前須先以溫水洗淨，之後使患部完全乾燥後，再塗擦本藥。
3. 若使用於皮膚感染，除非醫師另有指示，本藥通常 1 天 1 次(可在睡前)，薄薄塗抹於患部及其周邊 2-3 公分寬的區域，並可加以摩擦幫助吸收。
4. 若使用於指(趾)甲感染，應先將被感染的趾甲盡可能剪短，再將本藥每日 1 次塗擦於患部，並可摩擦幫助吸收，也可再使用密封式繃帶包住指甲部。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是本藥成分 Naftifine 過敏者。
2. 本藥僅供局部皮膚外用，不應使用在急性發炎或開放傷口，也不可用於眼部。
3. 為了預防復發，在所有症狀消失後，通常必須再持續治療約 2 星期。治療期間長短會依各別疾病症狀有所差異，請按照醫師指示完成療程。
4. 常見副作用為局部皮膚刺激反應，如灼熱感、乾燥、搔癢，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或

臺北市立



已懷孕請告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。