

藥物成分

劑型

櫃號

Povidone-iodine 外用藥膏

版本：TPE202309／檔號：2023-708

☞ 藥品商品名及含量

金碘軟膏 10% 450 毫克/罐 (Sindine ointment)

碘不痛軟膏 10% 450 毫克/罐 (Plusdine ointment)

☞ 藥品作用

能於皮膚表面形成殺菌膜，碘持續游離出來，產生殺菌作用，對於細菌、黴菌、濾過性病毒等均有效。

☞ 使用方式

依醫療人員指示，以棉球沾取適量後塗於患部。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師是否對普維酮、碘過敏或是有其他疾病。使用藥品前後應洗淨雙手。
2. 使用此藥物會使皮膚或衣物染色，請小心不要接觸紡織品。
3. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
4. 除非醫生或藥師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
5. 除非有醫師/藥師指示，本外用藥膏請勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
6. 除非有醫師/藥師指示，使用皮膚外用藥後請勿以緊密敷料覆蓋，以免增加副作用。
7. 常見的副作用有局部刺激、搔癢、灼痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
8. 請保存在幼兒/寵物無法接觸的地方，並應避免陽光直射，存放於乾燥陰涼之處。
9. 本藥有全身性吸收之可能性。因此反覆使用於新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及授乳婦不可自行使用，需經醫師診療後許可。
10. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。