



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Bicalutamide</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-057		

## ☞ 藥品商品名及含量

可蘇多錠 50 毫克/錠 (Casodex tablets)

歐百健膜衣錠 50 毫克/錠 (Abicalutamide F.C. tablets)

## ☞ 藥品作用

抑制雄性激素作用，與其他療法併用於進展性攝護腺癌。

## ☞ 服用方式

1. 通常一天服用一次，每次一粒口服使用，飯前飯後皆可。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間(12 小時內)，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或有其他疾病，特別是：**肝臟**疾病、糖尿病、乳糖不耐症、心律不整、心臟病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血劑(Warfarin)、胃藥(Cimetidine, Cisapride)、抗黴菌藥(Ketoconazole)、過敏藥(Terfenadine, Astemizole)可能導致藥物交互作用，請務必主動告訴醫療團隊，提供您正在使用的所有藥物名稱。若治療期間需使用其他藥物，請主動告知醫師或諮詢藥師。
3. 本藥可能會影響血糖控制，使用期間請**注意血糖的變化**。此藥物可能會導致頭暈或嗜睡，在您未清楚藥物可能對您造成影響前，不要開車或使用危險機械。
4. 常見副作用為：便秘、水腫、乳房觸痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀 請立刻就醫：噁心、血尿、熱潮紅、男性女乳症、手腳麻木、短期內體重增加
6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸



胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥  
分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥  
師。