

藥物成分

劑型

櫃號

Silodosin

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-744

☞ 藥品商品名及含量

迅攝康膠囊 4 毫克/膠囊 (Siliflo Capsules)

優列扶膠囊 4 毫克/膠囊 (Urief Capsules)

☞ 藥品作用

治療攝護腺(前列腺)肥大所伴隨的排尿困難。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1-2 次，飯後每次 1 粒。

2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嚴重肝/腎功能不良。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他攝護腺肥大藥物、血壓藥、抗黴菌藥(如 ketoconazole 或 itraconazole)、clarithromycin、某些抗愛滋藥(如 ritonavir)。

3. 如需進行眼科手術(例如白內障)，請告知醫師有使用本藥。

4. 本藥初使用時可能會引起姿勢性低血壓/暈眩，請將起身動作放緩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。

5. 使用本藥期間建議定期追蹤三酸甘油脂(血脂的一種)。

6. 常見副作用為口渴、姿勢性低血壓、腹瀉、頭暈/頭痛、射精障礙、鼻塞，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重過敏(大範圍紅疹或頭頸腫脹)、昏厥、呼吸急促。

臺北市立

聯合醫院

TAIPEI CITY

TUOHU CITY HOSPITAL

8. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。